

# **AJUSTE A LAS RECOMENDACIONES EN EL TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA**

**M Caicoya, M Folgueras**

# INTRODUCCION

- El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en España.
- En 2012 se calculaba que se habían diagnosticado 27.853 cánceres.
- La supervivencia relativa a los 5 años (2000-2007) fue 84,59%
- En consecuencia la prevalencia es alta
  - al año 25.738
  - a los tres años 68.424
  - a los 5 años 102.559, el 31,4% de todos los cánceres en varones.
-

# INTRODUCCION

- Las opciones terapéuticas en estadio local, de acuerdo con el protocolo de cáncer de próstata de son
  - cirugía radical
  - radioterapia
  - vigilancia activa.
- No se contempla la opción de hormonoterapia
- PCAI de Cáncer de Próstata. Actualización 2013. Disponible en Astursalud Profesionales

# OBJETIVO

- Evaluar la adecuación de la tecnología terapéutica a las recomendaciones establecidas

# MATERIAL Y METODO.

- Desde 2004 existe un registro de tumores en cada hospital de la red de utilización pública con una base común y centralizada de recogida de datos.
- Se evalúan los años 2009-2012.
- Se excluyen los pacientes en los que falta información para la estadificación.

# RESULTADOS

**TABLA 1. DISTRIBUCION DE ESTADIOS 2009-2012**

<b>año</b>	<b>local</b>	<b>%</b>	<b>regional</b>	<b>%</b>	<b>avanzado</b>	<b>%</b>	<b>total</b>
2009	475	77.90%	12	2.00%	29	4.80%	611
2010	514	84.00%	11	1.80%	42	6.90%	612
2011	658	89.90%	17	2.30%	34	4.60%	732
2012	641	85.20%	26	3.50%	46	6.10%	752
<b>2009-12</b>	<b>2288</b>	<b>84.52%</b>	<b>66</b>	<b>2.44%</b>	<b>151</b>	<b>5.58%</b>	<b>2707</b>

# RESULTADOS

## PRIMER TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA LOCALIZADO 2009-2012

<b>Grado</b>	<b>CRG</b>	<b>%</b>	<b>HMTRP</b>	<b>%</b>	<b>NOTTO</b>	<b>%</b>	<b>RDTRP</b>	<b>%</b>	<b>OTROS</b>	<b>TOTAL</b>
0	14	<b>0.13</b>	32	<b>0.30</b>	6	<b>0.06</b>	53	<b>0.49</b>	3	108
1	191	<b>0.33</b>	131	<b>0.23</b>	35	<b>0.06</b>	194	<b>0.34</b>	24	575
2	450	<b>0.47</b>	200	<b>0.21</b>	40	<b>0.04</b>	236	<b>0.25</b>	22	948
3	150	<b>0.32</b>	200	<b>0.43</b>	8	<b>0.02</b>	95	<b>0.20</b>	14	467
OTROS	11	<b>0.34</b>	10	<b>0.31</b>	0	<b>0.00</b>	10	<b>0.31</b>	1	32
<b>TOTAL</b>	<b>816</b>	<b>0.38</b>	<b>573</b>	<b>0.27</b>	<b>89</b>	<b>0.04</b>	<b>588</b>	<b>0.28</b>	<b>64</b>	<b>2130</b>

# RESULTADOS

- Hay 573 casos de cáncer de próstata localizado con tratamiento inicial de hormonoterapia, casi la mitad reciben posteriormente radioterapia.



# DISCUSION

- Tanto la el NCCN como la AUA recomiendan que la deprivación androgénica no se incluya entre las opciones estándar en cáncer de próstata localizado.
- Una revisión actual demuestra que los pacientes clasificados como de alto riesgo de acuerdo con la AUA no obtienen ningún beneficio de la hormonoterapia en la mortalidad por cáncer de próstata
- Potosky AL et al J Clin Oncol 2014 32:1324-1330.

# DISCUSION

- Sin embargo, el tratamiento hormonal es práctica habitual en este cáncer como se demuestra en el estudio de Potosky que evaluaron 15.170 casos de cáncer localizado en los que no hubo un tratamiento con intención curativa, de ellos 3.435 recibieron terapia hormonal.

# DISCUSION

- Dados los efectos secundarios y el coste de este tratamiento, conviene explorar en más profundidad las razones para su empleo

TABLA 2. COMBINACIONES DE TRATAMIENTO EN CANCER DE PROSTATA LOCAL 2009-2012												
TRATAMIENTO	Cx	C	Cx+ + Rt	Ht	Ht	Ht+ + Rt	Rt	l	P	No a l	No tx +H t	
NUMERO	743	66	52	28	82	236	531	61	2	1	59	1
PORCENTAJE	0.215	0.088	0.070	0.038	0.110	0.318	0.715	0.082	0.003	0.001	0.008	0.000289